

# Impfkalender 2020/2021 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2020

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)													Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)								Erwachsene (ab 18 Jahre)	
	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5–10	U6 11*	U6 12	13–14	15	U7 16–23	U7a/U9 2–4	U9 5–6	U10 7–8	U11/J1 9–14	15–16	J2 17	ab 18	ab 60					
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	G3																			
Tetanus		6-fach-Impfung		G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre						
Diphtherie								N			N			A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre			
Keuchhusten (Pertussis)					N			N			A1	N	A2		N		A <sup>e</sup>	N					
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)								N															
Kinderlähmung (Polioomyelitis)								N							A	N							
Hepatitis B								N															
Pneumokokken		G1 <sup>b</sup>	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N										S <sup>g</sup>						
Meningokokken C							G1	N															
Masern						G1	N			G2	N						S <sup>f</sup>						
Mumps						3-fach-Impfung MMR	N			3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N												
Röteln							N					N											
Windpocken (Varizellen)						G1	N			G2	N												
HPV (Humane Papillomviren)													G1 <sup>d</sup> +G2 <sup>d</sup>	N									
Gürtelrose (Herpes Zoster)																	G1 <sup>h</sup> +G2 <sup>h</sup>						
Grippe (Influenza)																	S <sup>jährlich</sup>						

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- G** Grundimmunisierung (bis zu drei Teilimpfungen G1–G3)
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- S** Standardimpfung
- A** Auffrischungsimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
- b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung 6 Monate
- d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9–14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich
- e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ogf. Poliomyelitis

- f** einmalige Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
- g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
- h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- j** Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden