Impfkalender 2021/2022 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2021

impfen-info.de
Wissen, was schützt.

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate)										Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre)						Erwachsene (ab 18 Jahre)	
	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1[a]		G2	G3														
Tetanus		G1[b] 6-fach-Impfung	N	G2 6-fach-Impfung	N	G3[c] 6-fach-Impfung	N					A1	N	A2		N	A alle 10 Jahre	
Diphtherie							N					A1	N	A2		N	A alle 10 Jahre	
Keuchhusten (Pertussis)							N					A1	N	A2		N	A[e]	N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)							N											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)							N							A		N		
Hepatitis B							N											
Pneumokokken		G1[b]	N	G2	N	G3[c]	N											S[g]
Meningokokken C							G1	N										
Masern						G1 3-fach-Impfung MMR	N		G2 3-fach-Impfung MMR + Windpocken	N							S[f]	
Mumps							N			N								
Röteln							N			N								
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N								
HPV (Humane Papillomviren)														G1[d]+G2[d]	N			
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1[h]+G2[h]
Grippe (Influenza)	Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere																	S jährlich

- **U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- **G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- **S** Standardimpfung
- **J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- **N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- **A** Auffrischimpfung

a die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen

b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)

c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung 6 Monate

d 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 - 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich

e einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis

f einmalige Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

g Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff

h zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Verlässliche, verständliche und nicht kommerzielle Informationen zum Thema Impfen: www.impfen-info.de